



معرفی دستگاه سی‌تی اسکن

دستگاه سی‌تی اسکن شامل یک تیوب مولد اشعه ایکس می‌باشد که دور بیمار می‌چرخد و در مدت کوتاهی تصاویری از مقاطع مختلف از ناحیه مورد نظر تهیه می‌کند. سی‌تی اسکن جهت مشاهده بهتر اندام‌های داخلی، استخوان‌ها و بافت نرم مورد استفاده قرار می‌گیرد و در موارد اورژانسی چون آسیب دیدگی‌ها، ضایعات داخلی و خونریزی‌ها گزینه تشخیصی خوبی می‌باشد.



اشیاء فلزی می‌توانند در کیفیت تصویر شما تأثیر بگذارند. نایابین بهتر است لباس زیپ‌دار و گیره‌دار، سنجاق سر، جواهرات، هینک، سمعک، دندان مصنوعی و اشیاء فلزی را که در قسمت مورد نظر قرار دارند را در آورید.

1

نکات ضروری جهت انجام سی‌تی اسکن

جهت انجام سی‌تی اسکن بدون کنتراست نیاز به آمادگی خاصی نمی‌باشد.

به همراه داشتن کلیه مدارک پزشکی قبلی در رابطه با سی‌تی اسکن فعلی اعم از تصاویر رادیولوژی، سی‌تی اسکن، سونوگرافی، جواب پاتولوژی و MRI و به خصوص جواب آزمایشات مربوط به عملکرد کلیه (BUN/creatinine) در صورتی که نیاز به تزریق ماده حاجب می‌باشد، به عنوان مسببه پرونده شما الزامی است.

2

3

در مواردی که سی‌تی اسکن با ماده حاجب به صورت خوراکی و تزریقی درخواست شود نیاز به آمادگی‌های زیر دارد:

۱ در بیماران سربالی در موقع اخذ نوبت به آنان آمادگی داده می‌شود و موارد عدم انجام تزریق از بیمار سؤال می‌شود.

۲ جهت انجام سی‌تی اسکن با تزریق، ارائه جواب آزمایش (BUN/creatinine) بیمار الزامی است.

۳ روز قبل، غذاهای سُکین نخورد.

۴ تقریباً 3 ساعت قبل از انجام تصویربرداری از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.

۵ داروهای خود را حلقه برنامه هیشگنی تان مصرف کنید؛ البته به جزء متغیرین. (قطع این دارو از 48 ساعت قبل از انجام آزمون الزامی است و مصرف دوباره فرمن منورین به شرط عملکرد ملیس کلیه‌ها پس از انجام آزمون با تزریق ماده حاجب بلا مانع است).

۶ برای بیماران بستری فرم رضایت قبل از تزریق (روز قبل با چند ساعت قبل) داده می‌شود تا بر اساس شرح حال و سابقه بیماری دستورهای لازم داده شود.

۰ کنتراندیکاسیون‌های (موارد عدم انجام) سی‌تی اسکن با کنتراست عبارتند از:

- انجام سی‌تی اسکن برای بانوان باردار ممنوع است مگر در شرایط اورژانسی.
- آسم- تنگی نفس، حساسیت مفرط به دارو- مولتیل میلوما.
- در بیماران با کراتینین بالا
- بیماران با نقص ایمنی تزریق کنتراست در شرایط خاص صورت می‌گیرد.
- در بیماران دیالیزی نوبت بیمار با تاریخ دیالیز مطابقت داده شده و طوری همراهی انجام شود که بلا فاصله بعد تزریق بیمار دیالیز شود.
- در آزمون‌هایی که بیماران سنگ صفا و یا سنگ سیستم ادراری دارند آزمون بدون کنتراست قبل از انجام تزریق و کنتراست خوراکی الزامی است.

نکات مهم:

- ✓ اگر از سابقه آلرژی خود به مواد حاجب و غذاهای خاص باخبر هستید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید تا داروهای کاهش دهنده بروز واکنش آلرژیک را تجویز نماید. توجه فرماید این داروها حداقل **۱۲ ساعت** قبل از انجام سی‌تی اسکن باید مصرف شوند.
- ✓ هر نوع بیماری که اخیراً به آن مبتلا شدید و یا سابقه آسم، دیابت، بیماری‌های کلیوی و مشکلات تیروئیدی را حتماً به پزشک خود و یا کارشناس انجام‌دهنده سی‌تی اسکن اطلاع داده و همچنین در فرم رضایت آگاهانه قید نمایید. عدم اطلاع پزشک و کارشناس مربوطه از بیماری شما ممکن است باعث بروز واکنش‌های آلرژیک خطرناک شود.
- ✓ بیماران محترم در صورت ابتلاء به بیماری مسری، مانند هپاتیت، سل، ایدز و بیماری‌های عفونی، مستول پذیرش را حتماً در جریان بگذارید.
- ✓ در سی‌تی اسکن‌هایی که بدون کتراست انجام می‌گردد نیاز به آمادگی قبلی نمی‌باشد و فقط باستی هیچ‌شی فلزی در ناجه عضو مورد نظر نباشد و اگر سی‌تی اسکن شکم و لگن بدون تزریق می‌باشد در یک هفته تا ده روز اخیر بیمار سابقه رادیوگرافی‌هایی مانند UGI، ترازیت، باریم انما نداشته باشد.
- ✓ اگر فرار است سی‌تی اسکن با ماده حاجب خوراکی هم انجام شود ۵ الی ۶ ساعت قبل از نوبت‌تان باید خوردن ماده حاجب خوراکی را شروع کنید. معمولاً ماده حاجب خوراکی (۳۰۰۰ مگلوبرین) را در یک بطری آب معدنی یک و نیم لیتری حل می‌کنند و شما هر ۱۰ دقیقه یکبار ۱ لیوان میل می‌کنید. به صورتی که لیوان آخر دقیقاً قبل از انجام آزمون نوشیده می‌شود.
- ✓ تا دو روز پس از انجام سی‌تی اسکن، حتماً روزی ۵ تا ۶ لیوان آب بتوشید تا ماده حاجب از بدن‌تان دفع شود.
- ✓ مادران شیرده باید تا ۲۴ ساعت پس از تزریق ماده کتراست به فرزند خود شیر ندهند.
- ✓ عکس‌العمل‌های بدن به ماده کتراست یددار و خطرهای آلرژیک جدی، بیمار نادر است. لذا لزوماً واکنش آلرژیک برای شما اتفاق نمی‌افتد. پس آرامش خود را حفظ کنید.
- ✓ بخش تصویربرداری به داروها و وسائل مورد نیاز از نظر انجام اقدامات اورژانسی هنگام بروز واکنش‌های آلرژیک مجهز می‌باشد و به این موارد سریعاً رسیدگی خواهد شد. هیچگونه نگرانی در صورت بروز واکنش‌های آلرژیک نداشته باشید.
- « زنان در صورت احتمال بارداری قبل از انجام سی‌تی اسکن حتماً باید پزشک یا کارشناس مربوطه را با خبر سازند.
- ✓ داروی تزریقی (حدود ۱۰۰۰ ماده حاجب) از طریق ورید دست تزریق می‌شود.
- ✓ در صورتی که تنها سی‌تی اسکن با تزریق درخواست شده باشد ناشایی ۲-۳ ساعت قبل از انجام سی‌تی اسکن کافی می‌باشد.

تذکر:

1. در صورت مراجعة بیماران اورژانسی، نیازمند همکاری شما در انجام خارج از نوبت این گونه بیماران هستیم و بدین وسیله قبلاً از شما پرداخت می‌طلبیم.
2. دقت داشته باشید در صورت تقابل شما به تحویل کلیشه بدون جواب جهت مراجعة به پزشک درخواست کنید، کلیشه به شما تحویل داده می‌شود و در صورتی که خواستار جواب کلیشه خود هستید بعد از بازگشت به مرکز و تحویل کلیشه، زمان انتظار از زمان تحویل کلیشه می‌باشد نه زمان انجام آزمون.
3. با مراجعة به آدرس اینترنتی pacs.gums.ac.ir وارد کردن کد ملی بیمار میتوانید سی‌تی اسکن بیمار را مشاهده کنید.
4. عکس‌های شما نهایتاً تا بک ماه نگهداری می‌شود و پس از آن مرکز هیچ مستولیتی در قبال تحویل آن‌ها به شما نخواهد داشت.