



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
بیمارستان شهید نورانی تالش

راهنمای گرفتن نمونه مدفوع در اطفال

- یک تکه نایلون پالستیکی روی پوشک انداخته و یا پوشک کودک را از قسمت پالستیکی ببندید. • کودک را با نایلون پالستیکی پوشک کنید.
- پس از دفع کودک، نمونه را با قاشقکی که در قسمت درب ظرف نمونه می باشد، از روی نایلون پالستیکی جمع نمانید.
- نمونه را در ظرف نمونه گیری مدفوع که از آزمایشگاه تحویل گرفته اید بریزید.
- در صورتیکه رساندن نمونه غیر اسهالی به آزمایشگاه مقدور نیست، نمونه را در یخچال قرار دهید و حداکثر ظرف مدت پنج ساعت به آزمایشگاه برسانید.
- در مورد نمونه های اسهالی بایستی فوراً به آزمایشگاه انتقال داده شود.
- حتماً توجه داشته باشید که قبل از گذاشتن ظرف نمونه در جایگاه مخصوص از تصدی پذیرش برچسب مشخصات کودک را تحویل بگیرید و بر روی نمونه بزنید.

منبع: Henrys (Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method)

تهیه کنندگان: پونه زورمند طولی کارشناس علوم آزمایشگاهی - معصومه پرورش سوپروایزر آموزش سلامت

تأیید کننده: دکتر سید نظام الدین هاشمی دکترای علوم آزمایشگاهی

واحد آموزش سلامت شهید نورانی تالش - پاییز ۱۴۰۰